

جنسی امراض

کا

ہومیوپیتھک علاج



ہومیوپیتھک ڈاکٹر فتح شیر

جلد حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب	_____	جنسی امراض کا ہومیو پیتھک علاج
مصنف	_____	ہومیو پیتھک ڈاکٹر فتح شیر
تاریخ اشاعت	_____ ۱۹۹۰	
تعداد	_____	۳ ہزار
قیمت	_____	۲۵ روپے
طبع	_____	پرنٹ بورڈ پرنٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ راولپنڈی

ناشر۔ الفتح ہومیو پیتھک دواخانہ، علیہ مجید روڈ راولپنڈی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تعارف

موجودہ دور میں انسانی صحت کے لئے مختلف قسم کی ادویات اور آلات ایجاد ہو چکے ہیں۔ لیکن اُس کے جنسی مسائل پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر افراد جنسی کمزوریوں اور عیاشیوں میں پڑ کر اپنی صحت تباہ کر رہے ہیں۔ سفیم اور ٹیلی وژن کے علاوہ اشتہاری حکیم اور بیشتر دوا ساز کمپنیاں جنسی مسائل کو مشتبہ کرنے اور انہیں ہرچیز بنا بنانے میں مصروف ہیں۔ اس طرح ان اداروں نے ایک سنجیدہ مسئلے کو ایک تجلّتی مسئلہ بنا لیا ہے۔

جنسی خرابیاں دور کرنے کے لئے جو میوہ پتھک طریقہ علاج میں نہایت اعلیٰ ادویات موجود ہیں۔ لیکن ان سے فائدہ صرف اسی صورت میں اٹھایا جاسکتا ہے۔ جب مریض میں بیماری سے نجات حاصل کرنے کا صحیح جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور وہ اُن تمام بُرے افعال سے باز آجائے جن کا وہ مرتکب رہا ہو۔ اگر مریض خود اپنے رویے میں فیصلہ کن تبدیلی پیدا کرنے کا اہل نہیں تو پھر اُسے کسی بھی طریقہ علاج سے فائدہ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔

جنسی خامیوں یا بیماریوں کے لئے جو میوہ پتھک اور بالو کیمک ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ اُن کی اہم علامات اس کتاب میں درج کر دی گئی ہیں۔ عمدہ نتائج حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کتاب کا بغور مطالعہ کیا جائے اور مریض کے لئے صرف ایک دوا منتخب کی جائے ایک سے زیادہ ادویات دینا یا ان کو ملا کر دینا، باری باری دینا یا ادویات کو جلد جلد تبدیل کر دینے سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو گا۔

ادویات کا استعمال 30 پونٹسی سے شروع کرنا مناسب ہے۔ پھر حسب ضرورت دوا کی پونٹسی کو 200 یا 1000 یا ایک لاکھ تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ بعض صورتوں میں درجہ تک 3، 6 یا 12 طاقت تک کھنایا جاسکتا ہے۔ بالو کیمک ادویات کا استعمال 6x سے شروع کرنا موزوں ہے۔ پھر ضرورت کے مطابق 12x، 30x یا 1000x تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ دوا کی چار خوراکیں روزانہ کافی ہیں۔ لیکن 200 یا 1000 طاقت کی ایک خوراک ہفتے میں ایک ہی دفعہ دینی چاہیے۔ ایک لاکھ طاقت کی ایک خوراک ایک ماہ یا اس سے زیادہ عرصے کے لئے کافی ہوتی ہے۔

فتح شیر

الفتح ہو میوہ پتھک دوا خانہ

علیہ مجید روڈ۔ راولپنڈی

۱۹۹۰ء

فہرست

حصہ اول (مردانہ)

صفحہ

مضمون

1	احلام
6	ایستادگی
10	بغل گیری
11	انزال
13	جریان
14	مادہ منویہ
15	جلق
18	جماع
26	نامردی
30	عضو مخصوص
31	بہ اثرات
34	ذہنی علامات

حصہ اول

(مردانہ)

احتلام

1۔ احتلام کی پُرانی شکایت جس کی وجہ سے مریض بہت تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرے۔ زندگی کے معمولات سے غافل ہو جائے اور اپنی پسندیدہ چیزوں سے بھی اُسے لگاؤ نہ رہے۔ مریض اپنی صحت کے متعلق ہر وقت فکر مند رہتا ہو۔

فاسفورک ایسٹ

2۔ ایسے مریض میں احتلام کی شکایت جو اکثر سردرد اور ہاضمہ کی خرابی میں مبتلا رہتا ہو۔ رہنے سہنے، کھانے پینے میں عیاش ہو۔ سالہ دار غذائیں استعمال کرے۔ کثرت مباشرت یا جلق لگانے کا عادی رہا ہو۔ احتلام زیادہ تر صبح کے وقت ہوتا ہو۔

نکس و امینکا

3۔ بکثرت احتلام کی وجہ سے مریض بہت کمزور ہو جائے۔ مریض غلیظ جو جلد کی تکالیف میں مبتلا رہتا ہو۔ ہاتھ، پاؤں اور سر کی چوٹی میں عموماً جلن کا احساس بھی پایا جاتا ہو۔

سلفر

ہو۔

4۔ موٹے، پلپے افراد میں احتلام۔ احتلام کے بعد ہم جسم پر خصوصاً ہاتھ پاؤں پر پسینہ آجائے۔ احتلام صبح 3 بجے سے تھوڑا بعد ہو۔

کلکیر یا کلاب

5۔ جنسی خواہشات دب جانے سے احتلام ہونے لگے۔ خضیوں میں درد رہتا ہو چکر آتے ہوں۔

کونیم

6۔ کثرت مباشرت یا جلق کی وجہ سے اکثر احتلام ہو جاتا ہو۔ مریض کے ذہن پر ہر وقت جنسی خیالات چھائے رہتے ہوں۔

سنگی سائیکیریا

7۔ احتلام و جریان ایسے افراد میں جو برسوں جلق لگانے کے عادی رہے ہوں۔ گہری نیند میں احتلام ہو جائے لیکن مریض کو جاگ بھی نہ آئے۔ نبض سست ہو اور دل کی تکلیف بھی ساتھ ہو تو یہ ترجیحی دوا ہے۔

دوبی میلس

8۔ بکثرت احتلام کی وجہ سے شدید کمزوری، غشی اور اندھلپن ہو جائے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو۔ کانوں میں گھنٹیاں سی بجتی ہوں۔ پیٹ ہوا سے پھولا رہے۔ چائنا

بغیر ایستادگی کے احتلام

1۔ احتلام عموماً جلق لگانے کا نتیجہ ہو۔ عضو ٹھنڈا، ڈھیلا، لٹکا ہوا۔ مریض ذہنی لحاظ سے صحت مند لیکن جسمانی طور پر کمزور ہو۔

لائیکوبوڈیم

- 2- احلام جلق لگانے کی وجہ سے ہو۔ مریض کے ذہن میں ہر
وقت جنسی خیالات کی کثرت رہے۔
شغلی سائیگیٹا
- 3- احلام کے بعد گھٹنوں میں کمزوری آجائے۔
ڈائسکوریٹا
- 4- احلام کے بعد کمزور ہونے لگے۔
کوپاٹم
- 5- احلام کے بعد ٹانگیں ٹھنڈی ہو جائیں۔
کریٹاٹس

خون آنا

- 1- احلام میں خون آنے یا خون آمیز مواد خارج ہو۔
مرک سہل۔ کینٹھرس

لیڈم پال۔ سلہ سپرٹا
پرو لیم۔ لیکیسر۔

وقت اور وقفہ

- 1- احلام اکثر صبح کے وقت ہوتا ہو۔
نکس و امیکا
- 2- احلام صبح تین بجے سے تھوڑا بعد ہوتا ہو۔
ملکیریا کارب
- 3- تقریباً ہر رات ہو جاتا ہو۔
نیٹرم فاس
- 4- جلق کے نتیجے میں احلام تقریباً ہر رات ہو۔ ایستادگی نہ
ہو۔ عضو تناسل مرجحایا ہوا۔
ار جنٹم میٹ
- 5- ہر دوسری رات ہو جائے۔
پلمرک ایسٹ
- 6- ہر تیسری یا چوتھی رات ہو جائے۔
نکس و امیکا
- 7- احلام بکثرت ہوتا ہو۔ رات کو دو دو تین تین بار ہو
جائے۔ بعد میں گھٹنوں میں شدید کمزوری محسوس ہو۔
ڈائسکوریٹا

جنسی خواب اور احتلام

1- جنسی خواب دیکھنے سے صبح کے وقت احتلام جو ہر تیسری

نکس وامیکا

یا چوتھی رات کو ہو جایا کرے۔

2- جنسی خواب دیکھنے سے اکثر احتلام ہو جاتا ہو۔ صبح نیم

خوابی کی حالت میں ایستادگی ہو۔ لیکن جاگ اٹھنے پر

ایستادگی ختم ہو جائے۔ جس بات کے متعلق سوچتا سوچتا

کیلیڈیم

سو جائے۔ اُسی کے خواب ساری رات نظر آئیں۔

3- جنسی خواب دیکھنے سے کثرتِ احتلام جو نامردی کا باعث

فاسفورس

بنے۔ جنسی خیالات مریض کے ذہن پر سوار رہیں۔

4- جنسی خواب دیکھنے سے احتلام۔ مریض کے ذہن پر ہر

وقت جنسی خیالات مسلط رہیں۔ مریض اپنی صحت کی

سٹفی سائیکیرا

خرابی کے متعلق بہت فکر مند ہو (فاسفورک ایسڈ)

سیلفیم۔ سارپریلا

5- جنسی خواب دیکھنے سے احتلام ہو جانے کی چند دیگر ادویات

ڈائسکوریا

بغیر خواب کے احتلام

1- بغیر خواب کے احتلام ہو جائے۔

ارجنٹم ٹائٹ۔

پکرک ایسڈ۔ جیلسمیم

ڈیجی ٹیلز

بایو کیمک ادویات

- 1۔ احتلام بغیر ایستادگی کے ہو جائے۔ مادہ منویہ درد کے ساتھ خارج ہو۔ اعصابی کمزوری بھی ہو۔
کلی فاس
- 2۔ خواب کے بغیر احتلام ہو۔ مادہ منویہ پانی کی طرح پتلا ہو
معدے میں تیزابیت، پیرٹ میں کیرے ہوں۔
نیٹرم فاس
- 3۔ ذہن بروقت جنسی خیالات میں مبتلا رہے۔ اسی وجہ سے احتلام ہو جاتا ہو۔
سلیشیا
- 4۔ احتلام کے بعد سردی اور سستی محسوس کرے اور شہوت کا زور ہو جائے۔
نیٹرم میور
- 5۔ جنسی خواب دیکھنے سے احتلام ہو جائے۔ مریض پست ہمت، نگین چڑچڑا اور شرمیلا ہو۔
کلی فاس

ایستادگی

ایستادگی کی شدت

- 1- شدید ایستادگی خصوصاً رات کے وقت جس کی وجہ سے عضو میں درد ہو۔ مریض تمام رات بے چینی سے گزارے۔
- 2- خواہش کی زیادتی جس کی وجہ سے نہایت تیز اور مسلسل ایستادگی رہے۔ رات کی شدید ایستادگی سے نیند میں خلل آجائے (پکرک ایسٹ)
- 3- خواہش کی زیادتی کی وجہ سے تکلیف دہ ایستادگی جس کے بعد پیشاب کی نالی میں سوئیاں ٹپپنے کا احساس ہو۔
- 4- بار بار ایستادگی جس پر قابو پانا مشکل ہو جائے۔ حد سے بڑھی ہوئی جھلکی خواہش۔ مریض کو جماع کا جنون ہو۔
- 5- شدید ایستادگی جس سے پیٹ میں درد ہونے لگے۔ مادہ منویہ مشکل سے خارج ہو یا اس کا اخراج نامکمل ہو۔
- 6- شدید ایستادگی کی چند دیگر ادویات۔

پکرک ایسٹ

کینتھرس

کنڈیس سٹلٹوا

فاسفورس

زنگم میٹ

پلائینا - پلسا میلا

نکس وامیکا

فلورک ایسٹ

ایستادگی کے اوقات اور مواقع وغیرہ

- 1- جمع کا خیال آتے ہی فوراً ایستادگی ہو جائے۔
 فاسفورس۔
 زنگم میٹ
 برشا کلاب
- 2- ایستادگی درے ہو۔
- 3- ایستادگی صبح کے وقت ہو۔
 اونیٹا کلاب۔
 اگنس کاشن
- 4- صبح نیم خوابی کی حالت میں ایستادگی ہو جو جانے پر ختم ہو جائے۔
 کیلیڈیم
- 5- صبح کے وقت جمع کی خوابش کے بغیر ایستادگی ہو۔ عضو
 سن اور اس کے سرے پر شہوانی خلش ہو۔
 ابراگریسا
- 6- نیند کی حالت میں ایستادگی ہو لیکن جانے پر ختم ہو جائے۔
 اوہیم
- 7- ایستادگی صرف رات کے وقت ہو۔
 پکرک ایسڈ
 کینٹھرس۔ پلاٹینا
- 8- ایستادگی لگاتار رہے۔
 فاسفورس۔ آرم میٹ
 فلورک ایسڈ۔
 نائٹرک ایسڈ۔
- 9- بوڑھے آدمیوں میں بکثرت ایستادگی۔
 کینٹھرس
 کاسٹیکم
- 10- لیٹ جانے پر ایستادگی ہو جائے۔
 اگزالف ایسڈ

- 11۔ کھانسنے سے ایستادگی ہو جائے۔
 12۔ ہیشاب کرنے کے بعد ایستادگی ہو جائے۔
 13۔ گاڑی میں سوار ہونے سے ایستادگی ہو جائے۔
 14۔ گھوڑے پر سواری کرنے سے ایستادگی ہو جائے۔
 15۔ انزال کے بعد ایستادگی ہو جائے۔
- کینتھرس
 نیٹرم کلاب
 کلکیریا فاس
 کنڈلس انڈیکا
 فاسفورک ایسڈ

نامکمل ایستادگی

- 1۔ بوس وکنبار اور دوسرے جنسی حیوانات سے بھی ایستادگی نہ ہو۔
 2۔ جماع میں ایستادگی کے بغیر ہی انزال ہو جائے۔
 3۔ ایستادگی برائے نام ہو۔ انزال کے بعد کمزوری اور چڑچڑاہٹ آجائے۔
 4۔ ایستادگی موجود ہو لیکن جماع کی کوشش پر عضو ڈھیلا پڑ جائے۔
 5۔ جماع کے دوران ایستادگی نامکمل ہو۔
- کیلیڈیم۔ نیوفرلیم
 کیلیڈیم۔ نیلمسیم
 سیلنیم
 کیلیڈیم۔ سیلنیم
 اگنس کاسٹنس۔
 ار جنٹم میٹ
 فاسفورک ایسڈ۔
 اگنس کاسٹنس۔
 کریٹائٹس۔ سلفر۔
 کوخیم۔ ملانیکو پوڈیم۔
 سیپیا

6۔ بغیر ایستادگی کے جملع کی خواہش ہو۔

کیلیڈیم۔ کوئٹہ۔
لائیکوپوڈیم۔
گریفائٹس

بایو کیمک ادویات

1۔ ایستادگی کے وقت عضو میں کمی اور درد ہو۔ درد کی وجہ
— عموماً سوزاک ہو۔

نیٹرم فاس۔
میگنیشیا فاس۔

2۔ ایستادگی تکلیف دہ ہو۔

کالی فاس
کلکیریا فاس۔
نیٹرم سلف
فرم فاس۔ سلیشیا

3۔ رات کے وقت تکلیف دہ ایستادگی ہو۔

4۔ گاڑی میں سوار ہوتے وقت ایستادگی ہو جائے۔ جس میں
جملع کی خواہش نہ ہو۔

کلکیریا فاس۔

بغل گیری

- 1- استاد کی موجود ہو لیکن بغل گیر ہوتے ہی ختم ہو جائے۔ نکس و اسکا
- 2- استاد کی بغل گیر ہونے پر ہی ختم ہو جائے یا انزال ہو جائے۔ کونیم
- 3- بغل گیر ہوتے ہی انزال ہو جائے۔ زخم میٹ
- 4- جماع کی خواہش زیادہ ہو لیکن جماع نہ کر سکے۔ استاد کی بغل گیر ہونے پر ہی ختم ہو جائے۔ کیلیڈیم۔ سیلفیم۔ لائیکو پوڈیم۔ کونیم۔ کلکیریا کلاب سیلفیم
- 5- بغل گیر ہونے پر بھی استاد کی نہ ہو۔
- 6- بغل گیری ہی میں ہو جائے۔ لائیکو پوڈیم
- 7- بغل گیر ہونے کی بڑھی ہوئی خواہش ہو۔ میوریکس
- 8- ساتھ کھڑے لوگوں سے بغل گیر ہونے کی خواہش۔ پلامینا۔ اگریکس

انزال

- 1۔ انزال کے بعد تکلیف ہو جائے۔
نکس و امیکا۔
- 2۔ جماع میں بغیر استادگی کے انزال ہو جائے۔
کلی کارب
کیلیڈیم۔ جیلسمیم
- 3۔ مکمل استادگی سے پہلے ہی انزال ہو جائے۔ انزال درد کے ساتھ ہو۔
سلفر
- 4۔ انزال میں بکثرت منی خارج ہو۔
نکس و امیکا۔
سٹفی سائیکریا
- 5۔ انزال بہت دیر سے ہو۔
فاسفورک ایسڈ
کلکیریا کارب
- 6۔ انزال دیر سے ہو۔ اور بعض اوقات ہو ہی نہیں۔
گرفائنس۔
لانی سین
- 7۔ انزال میں ایسے محسوس ہو۔ جیسے مادہ منویہ چھیل دینے والا ہے۔
کونیم

سرعتِ انزال (دیکھئے بغل گیری بھی)

- 1۔ مکمل استادگی سے پہلے یا اس کے فوراً ہی بعد انزال ہو جائے۔
سلفر۔
فاسفورک ایسڈ

2- دخول سے پہلے ہی انزال ہو جائے۔ منی کا اخراج درد کے ساتھ ہو۔

سلفر

3- جماع کی خواہش بڑھی ہوئی ہو۔ لیکن عضو کمزور ہو۔ جلد انزال ہو جائے۔

نیرم میور

4- جماع کے دوران جلد ہی انزال ہو جائے۔

گریفائٹس۔

زنگم میٹ

5- سرعتِ انزال۔ ایستادگی برائے نام۔ جماع کرنے پر خود اعتمادی نہ ہو۔

سیلنیم

6- سرعتِ انزال۔ جماع کے بعد کمزور اور کمزوری ہو جائے۔

سٹیفی سائیکیریا

7- سرعتِ انزال، جریان، نامردی جو جلق لگانے کی وجہ سے ہو جائیں۔

یوفو

عورت کی موجودگی

1- عورت کی قربت سے، اُسے دیکھنے سے یا اُس کا خیال آنے سے ہی انزال ہو جائے۔

کونہیر۔ سیلنیم

پلرکن ایسٹ۔

2- عورت کو چھونے سے ہی انزال ہو جائے۔

میوریکس

3- عورت کی قربت سے، جماع کا خیال آنے سے یا بوس و کنار سے انزال ہو جائے۔

کونیم

بایو کیمک ادویات

کلیریفاس۔

1- سرعتِ انزال

کالی فاس۔ نیرم میور

جریان

1- اُنٹے بیٹھتے، چلتے پھرتے اور پاخانہ کرتے وقت منی یا مذی کے قطرے خارج ہوتے رہیں۔

2- بوس وکنڈ کے دوران مذی خارج ہونے لگے۔

3- پاخانہ پر زور لگانے سے مذی کے قطرے بہنے لگیں۔

4- قبض کی وجہ سے پیشاب کے ساتھ منی یا مذی کے قطرے خارج ہوں۔

5- مشت زنی یا کثرتِ مباشرت سے جریان منی ہو جائے۔

6- منی یا مذی کے قطرے کرتے رہنے سے منظر کمزور ہو جائے۔

7- جریان جب کہ دل کی غیر معمولی دھڑکن بھی ہو۔

بایو کیمک ادویات

1- جریان منی یا مذی

نیٹرم فاس۔

کالی فاس۔

نیٹرم میور سلیشیا۔

کلکیریا سف

کونیم۔ اگنس کاشس

ایلو مینا۔ انا کارڈیم۔

اگنس کاشس

نکس و امیکا۔ سلفر

فاسفورک ایسڈ۔

سٹفی سائیگیریا۔

فاسفورس۔ یوفو۔

کالی کلاب

ڈبی ٹیلنس۔

برشا کلاب

مادہ منویہ

- 1- پانی کی طرح چٹا ہو۔
 - 2- خونی ہو۔
 - 3- خون آمیز ہو۔
 - 4- جس کی تیز بو ہو۔
 - 5- بوگندے پریشاب کی مانند ہو۔
 - 6- گرم ہو۔
 - 7- ٹھنڈا ہو۔
- سیلنیم۔ سلفر۔
 سیسہ۔ نیشترم فاس
 لائیکوپوڈیم۔
 فلورکب ایسڈ
 مرک سال۔ لیڈم۔
 سارپریٹا۔ سٹریس
 لیکیس
 نیشترم فاس
 کلکیریا کارب۔
 ٹرٹولائیو بنس۔
 اگریکس
 نیشترم میور

جَلَق

(مشت زنی، خود لذتی)

عادت، رحمان

1۔ جلق لگانے کا زبردست رحمان ہو

یوفو۔ پلاٹینا۔

اور بحانم

سنگی سائیکیرا

فاسفورک ایسڈ

لیکیمس۔

2۔ مریض جلق لگانے کی وجہ سے استہوائی پشیمان ہو۔ اور اپنی

صحت کی خرابی سے فکر مند رہتا ہو۔ جلق لگانے اور اغلام

بازی کی عادت چھڑانے کے لئے مفید ہے۔ فاسفورک ایسڈ

3۔ مریض تنہا جگہ کی تلاش میں رہتا ہو تاکہ مشت زنی کر

سکے۔ اسی وجہ سے سرعتِ انزال، جریان اور نامردی ہو

جائے۔

یوفو

4۔ بڑھی ہوئی جنسی خواہش اسے پاگل سا بنا ڈالے

(فاسفورس) اور جلق لگانے کی طرف مائل کر دے۔ جلق

لکانے کی عادت اور اس کے برے اثرات کو ختم کرنے کے لئے قابل اعتماد ادویات میں (فاسفورک ایسڈ) اور ہکامیم۔ اسٹیلکو

5۔ ایسے مریض میں جلق کی عادت دُور کرے جسے صبح غنودگی کی حالت میں ایستادگی ہو لیکن جاگ اٹھنے پر ایستادگی ختم ہو جائے۔ عضوسر، لٹکا ہوا اور پلپٹا ہو۔

کیلیڈیم

6۔ جملع کی خواہش دب جانے سے اگر مریض جلق لکانے لگے تو اس کی عادت کو روکے گی۔ اگر مریض کو چکر بھی آتے ہوں تو ترکیبی دوا ہے۔

کو نیم

7۔ بلوغت سے پہلے ہی جلق لکانے کا عادی ہو جائے۔ نیند کے دوران مشت زنی کرے۔ جلق لکانے کی عادت اور اس کے برے اثرات کو دُور کرتی ہیں۔

نکس واسیکا۔

پلاٹینا

جلق سے تکالیف (دیکھتے بد اثرات بھی)

- 1۔ جلق باز جو اعصابی تکالیف اور ذہنی و جسمانی کمزوری میں مبتلا ہو جائیں۔ مریض مرد ہو یا عورت۔
- 2۔ نوجوان جو جلق لکانے یا کثرتِ مباشرت سے نامرد ہو جائیں
- 3۔ جلق لکانے سے شدید کمزوری یا دیوانگی ہو جائے۔ مریض کی آنکھوں کے نیچے سیاہی مائل نشان ہوں۔ مریض چڑچڑا ہو۔ اور اس میں شرمیلا پن پایا جائے۔ مشت زنی چمڑانے کے لئے بہت اچھی دوا ہے (اسٹیلکو)

کالی فاس۔ جیلسمیم

لائیکو پوڈیم۔ کیلیڈیم

سٹیفی سائیکیرا

4۔ جلق لکانے یا کثرتِ مباشرت سے عضوِ لو تھوڑے کی مانند
ڈھیلا ہو جائے۔

کیلیڈیم
جینٹیم

اکس کلسٹریٹ

بایو کیمک ادویات

کلکیریا فاس

1۔ جلق لکانے کا رجحان ہو۔

2۔ جلق لکانے کی وجہ سے اعصابی کمزوری۔ مریض شرمیلا

کالی فاس

چڑچڑا اور کم ہمت ہو جائے۔

جماع

خواہش کی زیادتی

1۔ جماع کی خواہش زیادہ ہو لیکن جماع نہ کر سکے۔ ایسا توگی بغل
گیر ہونے پر ہی ختم ہو جانے۔

کیلیڈیم۔ سیلفیم۔
کونیم۔ نکس و امیکا
لائیکوپوڈیم۔

2۔ جنسی خیالات زیادہ ہوں لیکن طاقت جماع ختم ہو جانے۔
عام جسمانی اور ذہنی کمزوری۔ جماع کرنے پر خود اعتمادی نہ
ہو

سیلفیم

3۔ ایک ہی رات میں کئی بار جماع کرنا چاہے۔ لیکن جماع کے
بعد ذہنی اور جسمانی کمزوری ہو جائے۔ مریض اپنی صحت کی
خرابی سے فکر مند رہے۔

فاسفورک ایسڈ

4۔ جماع کی شدید خواہش ہو۔ دھیان ہر وقت جنسی معاملات
میں لگا رہے۔

سٹفی سائیکیریا

5۔ بوڑھے آدمیوں میں جماع کی خواہش بڑھ جائے۔ لیکن
دراصل وہ نامرد ہوں۔

لائیکوپوڈیم۔ سیلفیم

6۔ جماع کی خواہش جنون کی حد تک بڑھ جائے۔ اپنے آپ کو
تکا کر دے جبکہ جماع کی طاقت کم ہو گئی ہو۔

فاسفورس

7- جماع کی شدہ یہ خواہش ہو۔ دخول کے ساتھ ہی انزال ہو
جانے۔ اس کے برعکس جماع سے بے رغبتی اور ایستادگی
کلبا لکل نہ ہونا بھی پایا جاتا ہے۔

گریفائٹس

8- کبھی جماع کی خواہش بہت زیادہ ہو اور کبھی اس کی رغبت
ہی نہ رہے

پلسائٹلا

پلاٹینا

9- جماع کی شدہ یہ خواہش کے ساتھ بدن میں لرزہ آجانے۔

10- مرد یا عورت میں جماع کی خواہش بڑھ جانے خواہ بوڑھے

ماسکس

ہی ہوں۔

11- کسی دوسری تکلیف کے دب جانے سے جماع کی خواہش

بڑھ جائے۔

کونیم۔ پلسائٹلا۔

کیمفر۔ لانی سین

خواہش کی کمی

1- جماع کی رغبت ہی نہ رہے

گریفائٹس۔

نیو فریئم۔ سفر

2- جماع کی خواہش ہی نہ رہے اور نہ ہی جماع کرنے کی طاقت

ہو۔

اگنس کاسٹس۔

کیلیڈیم۔ سیفیم۔

اناسموڈیم

گریفائٹس۔ سیپا

کالی بانی

3- مرد یا عورت کو جماع سے نفرت ہو جانے۔

4- موٹے آدمی میں جماع کی خواہش نہ رہے

- 5- جماع کی خواہش کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی رہے۔ جماع میں
 لطف نہ آئے۔ عضو ٹھنڈا۔
 لائیکو پوڈیم
 6- جماع کی خواہش کم ہو جانے کی چند دیگر ادویات۔
 سنٹھی سائیکیریا۔
 سلیشیا۔ برشا کلاب

جماع کے دوران

- 1- تکلیف بڑھ جائے۔
 کینٹھوس۔ سیلفیم
 کریفائٹس۔
 کلی کلاب
 2- درد ہونے لگے۔
 ار جنٹم نائٹ۔
 کلکیریا کلاب
 سیل سیرولیٹا
 3- انزال نہ ہو۔
 گریفائٹس۔
 4- انزال سے درد ہونے لگے۔
 ملی لوٹس
 5- انزال میں مادہ منویہ ٹھنڈا ہو۔
 سلفر۔ مرک سال
 6- انزال میں مادہ گرم ہو جس سے پیشاب کی نالی میں جلن
 نیٹرم میور
 ہونے لگے۔
 اگریکس

7۔ لطف آنے کے کچھ وقت بعد ہی منی خارج ہو یا جماع میں
لطف نہ آئے عضو پر گد گدی ہونے لگے جس کی وجہ سے

علیحدہ ہونا پڑے۔

کلکیر یا کلاب

8۔ عضو عیسا پڑ جائے۔

کیلینڈیم

9۔ تشنج ہو جائے۔

یوفو

10۔ نیمہ آجائے

لانیکوہوڈیم۔

برشا کلاب

جماع کے بعد

1۔ محالیف یہ ابو جائیں

اگر یکس۔

کلی کلاب

کلکیر یا کلاب

سلیشیا۔ سیمیا

کلی کلاب۔

2۔ احتلام ہو جائے۔

برشا کلاب۔

نیرم میور

فاسفورک ایسڈ

3۔ انزال میں بکثرت منی خارج ہو۔

4۔ بے چینی ہو جائے۔

سیمیا

5۔ بے چینی، کالی اور کمزوری ہو جائے۔

کلکیر یا کلاب۔

سیلنیم

فاسفورک ایسڈ۔

نیشترم فاس

نیشترم فاس۔

گریفٹائٹس

6۔ باتیں بھولنے لگے۔

7۔ پسینہ آجائے

8۔ ہاتھوں پر ٹھنڈا پسینہ آجائے۔ ذہنی اور جسمانی کمزوری

محسوس ہو کر اور سر میں درد ہو۔ ٹانگیں کانپنے لگیں۔

کلکیریا کارب

سٹیفی سائیڈیریا

سمیل سیرولیٹا

کینٹھرس

اگریکس

گریفٹائٹس

کلکیریا کارب

کریازوٹ

آئیوڈیم۔

سمیل سیرولیٹا

سیمپا۔ بووٹا

ڈافن

امبراگراسیا

اگریکس۔ کالی فاس

فاسفورک ایسڈ

اگریکس۔

ایسا فوٹیڈا

9۔ ہیشاب کی حاجت ہو جائے۔

10۔ ہیشاب کرنا مشکل ہو جائے۔

11۔ ہیشاب کی نالی میں درد ہونے لگے۔

12۔ تشنچ ہو جائے۔ بھوک لگ جائے

13۔ ٹانگیں ٹھنڈی ہو جائیں۔

14۔ کمزوری بہت ہو جائے۔ ٹانگیں کانپنے لگیں۔

15۔ عضومیں جلن ہونے لگے۔

16۔ خبیثے سکڑنے لگیں۔

17۔ کئی قسم کی سکالیف پیدا ہوں۔ خصوصاً چکر آنے لگیں۔

18۔ دانت درد ہونے لگے۔

19۔ جماع کی کوشش پر دم ہو جائے۔

20۔ رتھ کی ہڈی میں تکلیف محسوس ہونے لگے۔

21۔ سوچ بچار کرنا مشکل ہو جائے۔

22۔ غش کھا جائے۔

23۔ نی یا سلی ہونے لگے۔
24۔ کرورد ہونے لگے۔

25۔ شہید جسمانی کمزوری ہو جائے۔

26۔ شہید جسمانی اور دماغی کمزوری ہو جائے
27۔ گھٹنوں میں کمزوری آجائے۔
28۔ مریض چڑچڑا اور حساس ہو جائے۔

29۔ ٹگین ہو جائے۔

30۔ مریض اپنے گزشتہ بُرے افعال پر چمکتا ہے۔ صحت کی
خوابی سے بہت لگرمند ہو۔

ہاسکس
کالی کلاب۔ کوبا ٹم۔
کنڈس ایشہ کا
اگر ہکس۔
کالی فاس۔ چاتنا۔
سیلفیم۔
فاسفورک ایسڈ۔
نکس وامیکا۔
کلکیریا کلاب۔
فاسفورس۔ نیٹرم میو
سٹفی سائیکیریا۔
انا کارڈیم۔
اکنس کاسٹس
فاسفورک ایسڈ
کلکیریا کلاب
سیلفیم۔ سلیشیا
سٹفی سائیکیریا۔
کلکیریا کلاب۔ سیما۔
نکس وامیکا۔ کوٹیم
سٹفی سائیکیریا۔

فاسفورک ایسڈ۔
سٹفی سائیکیریا

31- خوش مزاج ہو جائے۔

32- خوشی اور ہلکا پن کا احساس ہو۔

33- اعلیٰ مستقیم میں ٹیس اٹھے۔

34- نظریہ ہم ہو جائے۔

35- بے خوابی ہو جائے۔

بایو کیمک ادویات

1- جماع کی خواہش شدید ہو

کالی فاس۔

کلکیریا فاس

نیشرم فاس

میکنیشیا فاس۔ سلیشیا

سلیشیا۔ کلکیریا فاس

کالی فاس۔

فیرم فاس

کالی سلف

4- جماع کی خواہش کم ہو جائے یا بالکل نہ رہے۔

5- جماع کے بعد کمزوری ہو جائے۔ منظر کمزور ہو جائے۔ درد

ہونے لگے۔

کالی فاس

سلیشیا

6- جماع کے دوران یا اس کے بعد متلی ہونے لگے۔

کالی فاس

سلیشیا

7۔ انزال کے بعد تکالیف میں زیادتی ہو جائے۔

سلیشیا۔

نثرم میور۔

نثرم فاس۔

مکھیر فاس۔

کالی فاس۔

کالی فاس۔

8۔ صبح کے وقت خواہش زیادہ ہو۔

نامردی

1- نامردی جو کثرتِ مباشرت، احتلام اور مشت زنی کی وجہ سے ہو مریض غصیل، محتاط اور بیٹھے بیٹھے کام کرنے والا ہو۔ کھانے پینے میں عیاشی برتے۔ سردی، کمر درد، قبض اور بواسیر میں مبتلا ہو۔ (یہ دوا خاطر خواہ فائدہ نہ دے تو سلفر دس)

نکس و امیکا

2- نامردی، مریض میں خوابش جماع ہی نہ رہے۔ اکثر احتلام ہوتا رہے سرعتِ انزال ہو۔ مریض شدید نقابت محسوس کرے۔ کمر درد اور باغمی کی خرابیوں میں مبتلا ہو۔ جسم کے مختلف اعضا میں جلد، خصوصاً ہاتھ، پاؤں اور سر کی چوٹی میں جلد اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔ سلفر

3- موٹے، پلپے، مریضوں کی نامردی کی دوا ہے۔ جو سردی زیادہ محسوس کرتے ہوں۔ انزال کے بعد مریض کو پسینہ آجاتا ہو۔ خصوصاً ہاتھوں پر ٹھنڈا پسینہ آنے جماع کے بعد سر اور کمر میں درد ہونے لگے۔

کلکیریا کارب

4- کثرتِ مباشرت اور مشت زنی کی وجہ سے نامردی۔ خوابش جماع کم ہو جانے۔ عضو چھوٹا، ٹھنڈا اور ڈھیلا ہو۔ ایستادگی کم ہو۔ بوڑھوں کی نامردی میں یہ دوا بہت کار آمد ہے۔ کثرتِ تمباکو نوشی سے نامردی کے لئے بھی یہ دوا مفید ہے۔

لانیکو پوڈیم

5۔ عضو میں ایستالگی نہ ہو۔ جلع کے وقت عضو ڈھیلا

ہو جائے۔ اتزال ایستالگی کے فوراً بعد اور کبھی ایستالگی

سے پہلے ہی ہو جائے اس کے بعد مریض ٹانگوں میں

کمروری محسوس کرے۔ اکثر سٹہ کی ہڈی میں جلن کا

احساس بھی ہوتا ہو۔ جو رات کے وقت بڑھ جاتا ہو۔ فاسفورک ایسڈ

6۔ مکمل نلردی جو کثرت جلع سے یا بار بار سوزاک ہو جانے

سے ہو گئی ہو (تھو جا۔ میڈور۔ نیم)۔ خواہش جلع بالکل نہ

رہے۔ عضو سرد اور پھلپھلا ہو جائے۔ بوڑھے افراد کی نلردی

جو جوانوں جیسی خواہش جلع رکھتے ہوں۔ مریض

قبل از وقت بوڑھا ہو جائے۔ اکنس ٹاسٹس

7۔ کثرت مبسرت یا جلق کی وجہ سے نلردی۔ جلع کی

خواہش زیادہ ہو لیکن جلع کی کوشش پر ایستالگی ختم ہو

جائے۔ صبح غنودگی کی حالت میں تو ایستالگی موجود ہو

لیکن جاگ اٹھنے پر ختم ہو جائے۔ کیلیڈیم

8۔ نلردی، جلع کی خواہش زیادہ ہو۔ لیکن علی طور پر نلرد

ہو۔ عضو کمزور اور ایستالگی بہت دیر کے بعد ہو۔ جلع کے

بعد کمروری اور چڑچڑاہٹ آجائے۔ جلع کرنے پر خود

احتمالی نہ رہے۔ اکثر منی یا مذی بہتی رہے۔ سیلفیم

9۔ کثرت جلع یا جلق کی وجہ سے نلردی ہو جائے۔ مریض

نگین، چڑچڑا اور شرمیلا ہو۔ جسمانی طور پر کمزور ہو۔ چہرہ

مرمھایا ہوا ہو۔ اور آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ جائیں۔ مریض

کے ذہن پر ہر وقت جنسی خیالات مسلط رہیں۔ سٹنی سائیکیرا

10۔ نامردی جس میں ایستادگی کم اور تھوڑے وقت کے لئے ہو۔ بغل گیر ہوتے ہی ایستادگی ختم ہو جائے یا انزال ہو جائے۔ زیادہ عرصہ تک کنوارا رہنے کی وجہ سے نامردی ہو جائے۔

کو نیم

11۔ جماع کی خواہش جنون کی حد تک ہو۔ لیکن کثرتِ جماع، کثرتِ احتلام، جلق یا نمک کے زیادہ استعمال کی وجہ سے نامردی ہو جائے۔ جماع کے خیالات بہت زیادہ ہوں اور جماع کی خواہش کار و کنا مشکل ہو جائے۔ تاہم نامردی ہو۔ فاسفورس

نامردی کی چند دیگر ادویات

1۔ کثرتِ جماع کی وجہ سے جماع کی خواہش ہی نہ رہے۔ لہذا نامردی ہو جائے۔

کرفاٹس

2۔ عضو کی شدید کمزوری، نامردی، بغیر ایستادگی کے احتلام ہو جائے، کمزوری کی وجہ سے کانپے۔ خضیوں پر پسینہ آئے۔

جیلسمیم

3۔ مادہ منویہ کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے نامردی ہو جائے۔

چاتنا

4۔ ذیابیطس کے ساتھ نامردی بھی ہو۔

ماسکس

5۔ عضو کی شدید کمزوری اور مادہ منویہ کے پتلا ہو جانے سے نامردی۔

برٹاکارب

6۔ چوٹ لگ جانے سے نامردی ہو جائے۔

آرنیکا۔ ہائپریم

7۔ نامردی، جماع نہ کر سکے۔ عضو مہیلا ہو۔ جماع کی بڑھی ہوئی خواہش ہو۔

لائیکوپوڈیم۔
کیلیڈیم۔
جینٹیم۔ سیلنیم۔

کلیریا کلاب
کیلیڈیم۔ سیلنیم۔
اکنس کاسٹس
ارجنٹم ٹائٹ

8۔ نامردی، جماع کی کوشش پر راستہ کی ختم ہو جائے۔

9۔ بوڑھوں میں جماع کی خواہش بڑھ جائے۔ لیکن وہ نامرد ہوں۔

لائیکوپوڈیم۔
سیلنیم۔
اکنس کاسٹس

بایو کیمک ادویات

1۔ نامردی

نیٹرم فاس۔
کلیریا فاس۔
کلی فاس۔ نیٹرم میور

عضو مخصوص

1- عضو چھوٹا، ٹھنڈا، لٹکا ہوا اور پلپٹا

کیلیڈیم۔

اگنس کاسٹس۔

سلفر۔ لائیکوپوڈیم۔

نیوفریٹم

کیلیڈیم۔

ماسکس

اگنیشیا

سٹفی سائیکیریا

میوریکس۔

لیک کناٹم۔ چائتا

2- عضو سرد اور اس پر ٹھنڈا پسینہ آئے۔

3- عضو چھوٹا کی مانند سکڑا ہوا لیکن ایستادگی پر مکمل

4- عضو چھوٹا اور پیچھے کی طرف کچھا ہوا۔

5- عضو دھیرا اور مر چھایا ہوا۔

6- عضو محض چھوٹے، نلے یا دبائے پر ہی ایستادہ ہو جائے۔

7- عضو کا اگلا سرائن ہو جائے یا اس پر کسی چیز کے رینگنے کا

احساس ہو۔

فاسفورک ایسڈ

کوکین

پلمبم

پلاٹینا

8- نامردی میں یہ احساس کہ عضو موجود ہی نہیں۔

9- احساس کہ عضو سی سے بندھا ہوا ہے۔

10- اعضائے تناسلی قبل از وقت نشوونما پانے لگیں۔

بداثرات

1- مادہ منویہ کے بکثرت ضائع ہو جانے سے جسمانی کمزوری۔
آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ کانوں میں گھنٹیاں بھیں۔
ہیٹ ہوا سے پھولا ہوا ہو۔ حاد اثرات کے لئے ترجیحی دوا

چانتا

2- مادہ منویہ ضائع ہو جانے کے مریض اثرات۔ چکر۔ ذہنی
تھکن کمزوری۔ ٹانگوں میں بھاری پن۔ مریض
اپنی صحت کی خرابی کے متعلق فکر مند رہتا ہو۔ زندگی کے
معمولات سے غافل ہو جائے۔

قاسفورک ایسڈ

3- کثرتِ مباشرت، کثرتِ مشیت زنی کے برے اثرات۔
مریض غمگین اور لاپرواہ ہو جائے۔ یادداشت کمزور۔ ذہن پر
ہر وقت جنسی خیالات چھائے رہیں۔

سٹیفی سائیکیریا

4- جلق لگانے کے بد اثرات، سردیوں ہاضمے کی تکلیف ہو
جائے۔ کثرتِ مباشرت اور احتلام کے برے اثرات کو
بھی دور کرتی ہے۔ نوجوانوں میں مشیت زنی کے برے
اثرات ختم کرنے کے لئے عمدہ دوا ہے۔

نکس و امیکا

5- احتلام، کثرتِ جملع یا مشیت زنی کی وجہ سے اعصابی کمزوری
ہو جائے بعض اوقات دل کی غیر معمولی دھڑکن ہو۔

ایوناسٹائیوا

6- مشیت زنی سے مرگی ہو جائے۔ مرگی سے ہوش و حواس قائم

قاسفورس

رہیں۔

7۔ مادہ منویہ ضائع ہونے کے بد اثرات۔ مریض قبل از وقت

بوڑھا ہو جائے۔

آگنس کاسٹس

نیٹرم میور

8۔ کثرتِ مباشرت سے فلج ہو جائے۔

9۔ مشت زنی، کثرتِ جماع کی وجہ سے مگی کا دورہ پڑنے

لگے۔ جماع کے دوران ہی مگی کا دورہ پڑ جائے۔

یوفو

10۔ مشت زنی، کثرتِ جماع کے بد اثرات جبکہ تمام جسم ڈھیلا

ڈھالا ہو گیا ہو۔ معمولی حادثہ یا واقعہ سے ہاتھ پاؤں کانپنے

لگیں۔

جیلسمیم

11۔ کثرتِ مباشرت سے رٹھ کی ہڈی میں تکلیف ہو

جائے۔

اگریکس

12۔ کثرتِ جماع اور مشت زنی کے بد اثرات کی دیگر اہم

ادویات۔

پکرک ایسڈ۔

انا کارڈیم

خواہشِ جماع دب جانے کے بد اثرات

1۔ جماع کی خواہش دب جانے سے تکلیف ہو جائے۔

کونیم۔ پلباٹیل۔

ایپس۔ کیمفر

2۔ خواہشِ جماع دب جانے یا زندگی بھر کنوارا رہنے کے

بد اثرات اگر چکر بھی موجود ہوں تو یقینی دوا ہے۔

کونیم

بایو کیمک ادویات

1- جماع کے بعد جسمانی اور دماغی کمزوری۔ بینائی مدہم ہو

جائے۔

کالی فاس
سلیشیا

2- جماع کے بعد کمزوری

ذہنی علامات

1۔ مریض اپنی صحت کی خرابی سے بہت فکر مند ہو۔ زندگی کے معمولات سے غافل ہو جائے۔ یادداشت ختم ہو جائے۔ جماع کے بعد سوچ بچار مشکل ہو جائے۔ خیالات کا سلسلہ قائم نہ رکھ سکے۔ انعام بازی کی عادت چھڑانے کے لئے مفید دوا ہے۔

فاسفورک ایسڈ

2۔ مریض اپنی صحت کی خرابی سے بہت فکر مند ہو ذہن ہر وقت جنسی خیالات میں پھنسا رہے۔ اپنی تکالیف بیان کرنے کے لئے تنہائی کا خواہشمند ہو۔ مریض چڑچڑا شرمیلا اور غمگین ہو۔

سٹفی سائیکیریا۔

3۔ جنسی خیالات کی وجہ سے رات بھر جاگتا رہے۔ بھول چوک اکثر ہو جاتی ہو۔ ایک کام کر لینے کے باوجود مریض کو یقین نہیں آتا کہ اس نے وہ کام کیا ہے یا نہیں۔ خیالات میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ مریض لیٹ جانے کی بے حد خواہش رکھتا ہے۔

کیلینڈیم

4۔ مرد ہو یا عورت جماع کا خبط سر پر سوار رہتا ہو۔ کثرت مباشرت اور جلق سے مریض بزدل اور قوت فیصلہ سے عاری ہو جائے۔ بعض اوقات دیوانہ ہو جائے۔

فاسفورس

5۔ جماع کی خواہش پوری نہ ہونے کی وجہ سے نگین رہنے لگے

اور اسی وجہ سے عورتیں، سٹریا میں مبتلا ہو جاتیں۔
کو نیم

6۔ مریض کو خدشہ ہو کہ شادی کے بعد وہ ناکام ثابت ہو گا۔

بے حد نگین ہو۔ زود رنج ہو اور بات بات پر بکڑ جائے۔

مریض خیال کرے کہ کچھ وقت کے بعد موت آجائے گی

اس لئے کوئی کام کرنا فضول ہے۔
اکنس کاسٹس

حصہ دوم (زنانه)

جماع

1- شرمگاہ کی خشکی جماع میں رکاوٹ پیدا کرے۔
نیرم میور۔
لائیکوبوڈیم۔
لائی سین

2- شرمگاہ نہایت حساس ہو جس کی وجہ سے جماع نہ کیا جاسکے۔

3- جماع میں لطف ہی نہ آئے۔
پلائینا۔ تموجا
کاسٹیل۔ سیپینا۔

بررس ولکرس

بروسیم

کونیم۔

سیمیل سیرولینا

4- جماع کی خواہش دب جانے کے برے اثرات۔

نفرت

1- جماع سے نفرت ہو۔ عورت شادی کا خیال تک برداشت نہ کر سکے۔

پلسائیل

ہائینڈ راسٹس

کریازوٹ

2- جملع کا خیال ناقابل برداشت ہو۔

3- جملع کے خیال ہی سے بے چین اور خوفزدہ ہو جائے۔

شہید خواہش

1- کنواری لڑکی میں۔

2- بیوہ عورت میں

3- بوڑھی عورت میں

4- حمل کے دوران

5- حیض آنے سے پہلے

6- حیض کے دوران

7- بچے کی پیدائش کے بعد عورت جب بستر پر ہو

8- جملع کی خواہش بڑھ جانے کی چند دوسری ادویات۔

پلاٹینا۔ کالی فاس

اوریٹانم۔ ایپس

ماسکس

سیلاڈونا

سیلاڈونا

پاساٹیل

سیلاڈونا

نکس وامیکا۔

کلیکیریا کارب۔

کالی فاس۔ لیکمیں۔

کریشی اول

بانیوسائیس۔

کینٹیمرس۔

شراونیم۔

وریٹرم الیم

خواہش کی زیادتی

1۔ جماع کی خواہش نہایت ہی شدید ہو۔ جنونِ شہوت ہے۔

پلاٹینا۔ اور۔ کانم

میورہ کس۔

کلکیر یا کلاب

2۔ جسم کے کسی حصے کو بھی اگر چھوا جائے تو جنسی خواہش بھڑک اٹھے۔

میورہ کس

اور۔ کانم۔

زنگم میٹھ۔

میورہ کس

3۔ جماع کی شدید خواہش جو اُسے جلق کی طرف مائل کر دے۔

اور۔ کانم۔

پلاٹینا۔

قاسفورس

4۔ جماع کی شدید خواہش کی وجہ سے بانجھ پن ہو جائے۔

5۔ جماع کی شدید خواہش جسے دبانے کے لئے اپنے آپ کو مصروف رکھے۔

لیمبرج

خواہش کی کمی (دیکھئے نفرت بھی)

1۔ جماع کی رغبت ہی نہ رہے۔

سپینا۔ نیرم میور۔

کاسٹیکم

اکنیشیا۔ انا سموڈیم۔

اکنس ہاسٹس۔

بیلوناس

2۔ جماع کی خواہش کم ہو جائے۔

جمع کے دوران

1- شرمکھ میں دروہو

پہیلا - نیرم میو۔

درجنم نامٹ

شٹی سائیگیرا۔

میرس وگرس۔

فٹی سین

2- شرمکھ میں درو محسوس کرے۔ درو جمع کے بعد بھی

رہے۔

3- جمع برداشت نہ کر سکے یا جمع کے دوران غش کھا جائے۔

کریاڈوٹ

پلاٹینا۔ اور کانم۔

میو۔ کس

لائیکو پوڈیم

4- شدید دروہو جمع کے دوران شرمکھ سے ہوا خالیج ہو

جمع کے بعد

1- تکالیف بڑھ جائیں۔

اگر یکس۔ سلیشیا

کلیریا کلب۔

کلی کلب سپیل۔

2- تھی شادی شدہ عورتوں کو پیشاب کرنے کے لئے زور

لگانا پڑے۔

3- شرمکھ میں دروہو نے لگے۔

سنٹی سائیگیرا

کریاڈوٹ

لائیکوپروڈیم - لائی سین
 ار جنٹم نامٹ -
 کریازوٹ -
 نامٹرک ایسٹ
 سپیا - نیٹرم کلاب

4- شرمگاہ میں جلن ہونے لگے۔
 5- شرمگاہ سے بکثرت خون بہنے لگے۔

6- لیکوریا شروع ہو جائے

بایو کیمک ادویات

کلکیریا فاس -
 کلکیریا فلور - سلیشیا
 کلکیریا فاس
 کالی فاس
 کلکیریا فاس
 فیرم فاس -
 کالی سلف
 فیرم فاس
 سلیشیا
 فیرم فاس -
 نیٹرم میور
 کلکیریا فاس

1- خواہش جماع زیادہ ہو جائے۔

2- حیض آنے سے پہلے جنسی خواہش بڑھ جائے۔

3- حیض کے بعد جنسی خواہش کا غلبہ ہو جائے۔

4- جنسی خیالات کا غلبہ رہے۔

5- جماع سے نفرت ہو جائے۔

6- شرمگاہ گرم، خشک، جماع کے بعد درد محسوس ہو۔

7- جماع کے دوران اور اس کے بعد متلی ہو جائے۔

8- جماع کے دوران شرمگاہ میں درد ہو۔

9- جماع کے بعد تکلیف بڑھ جائے۔

جَلَق (انگشت زنی)

1- لڑکی میں انگشت زنی کی شدید خواہش -
اور بکائیم - پلاٹینا -
گریشی اولہ

2- جماع کی شدید خواہش یا شرمکام میں خارش جو اسے انگشت
زنی کی طرف مائل کر دے -

اور بکائیم - کیلیڈیم -
ونکم میٹھ - میوریکس
پلساٹیلہ

3- جلق لگانے کی وجہ سے لیکوریا ہو جائے -

4- عورت جو جلق لگانے کی مر تکب رہی ہو - وہ شادی کے
بعد جماع میں بالکل لطف محسوس نہ کرے -

اگنس کاسٹس
اور بکائیم - پلاٹینا -
کریازوٹ

5- شرمکام میں شہوانی خارش -

متفرق

1- جلد ہی حمل ٹھہر جائے -
نیزم میور - مرک سال

2- اعضائے تناسل قبل از وقت نشوونما پانے لگیں -
پلاٹینا

ادویات کے تعلقات

اس کتاب میں تقریباً 90 ہو میوہد متھک ادویات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کتاب کو مفید تر بنانے کے لئے صرف ان ادویات کے آپس میں تعلقات درج کر دیئے گئے ہیں۔ جن کی مددگار دفع اثر یا مخالف دوائیں بھی ان 90 ادویات میں ہی موجود ہیں۔ وہ ادویات جن کی دفع اثر ادویات تو ہیں لیکن مددگار یا مخالف ادویات نہیں ہیں انہیں اس فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔ کیوں کہ ترکیبی دفع اثر دوا ان ادویات کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے جس کے لئے کسی بھی تفصیلی فہرست سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

ادویات	مددگار دوائیں	دفع اثر دوائیں	مخالف دوائیں
ارجنٹم نائٹ	کالی کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ سلفر۔ سلیشیا۔ فاسفورس		
آرنیکا	کلکیریا کارب۔ ورمیرم الیم	کیمفر	
اکس کاشس	کیلینڈیم۔ سیلنیم	کیمفر۔ نیشرم میور	
اکیشیا	نیشرم میور۔ سیپیا۔ فاسفورک ایسڈ	کیمفر۔ آرنیکا	
اناکارڈیم	لائیکوپوڈیم۔ پلساٹیل۔ پلامینا		
آئیوڈیم	لائیکوپوڈیم۔ سلیشیا	گریشی اول۔ لہس۔ تھوجا	فاسفورس
لہس	سلفر۔ برشا کلاب۔ پلساٹیل۔ آرنیکا	کینٹھرس۔ لیکیس۔ لیڈم پیل	فاسفورس
بررس وگرس	نیشرم میور لائیکوپوڈیم	سلاڈونا۔ کیمفر	
برشا کلاب	سلیشیا	کیمفر۔ سلاڈونا۔ مرک سال زنگم میٹ	کلکیریا کلاب
بروسیم	ارجنٹم نائٹ۔ کالی کلاب	کیمفر۔ اسونیا کلاب۔ اوہیم	
سلاڈونا	کلکیریا کلاب۔ مرک سال۔ نیشرم میور	پلساٹیل۔ کیمفر۔ اوہیم۔ ہائیوسائیمس	
یوفو	کلکیریا کلاب	لیکیس اوہیم	

ادویات	مددگار دوائیں	دفع اثر دوائیں	مخالف دوائیں
پٹرولیم	سپیا	نکس و امیکا۔ فاسفورس	
پلاٹینا	سپیا۔ اناکارڈیم	یلاڈونا۔ پلسامیلا	
پلسامیلا	لائیکوپوڈیم۔ سلشیا۔ کللی بائی۔	نکس و امیکا۔ اکنیشیا	
	سپیا۔ زنگم میٹ		
تھوجا	سلشیا۔ مرک سال۔ نیرم میور۔	سٹفی سائیکیرا	
	ناٹرک ایسڈ		
بیلسمیم	سپیا۔ ار جٹم ناٹ۔ کلکیریا فاس۔	نیرم میور۔ مرقی نیلس۔ نکس و امیکا	
	کللی کارب	پلسامیلا۔ ملنر۔ ورنیرم البم	
چاتنا	کلکیریا فاس۔ کللی کارب	لیکس۔ نیرم میور۔ نکس و امیکا۔	
		سپیا۔ پلسامیلا۔ سلفر۔ ورنیرم البم	
ڈبی نیلس	یلاڈونا۔ نکس و امیکا۔ سلفر	کیمفر۔ لیمس۔ کلکیریا کارب۔ اوویم	
		ناٹرک ایسڈ	
زنگم میٹ	پلسامیلا۔ سپیا۔ سلفر۔ کلکیریا فاس	کیمفر۔ اکنیشیا۔	نکس و امیکا
سٹفی سائیکیرا	کاسٹیکم	کیمفر	
سپیا	نیرم میور۔ فاسفورس۔ نکس و امیکا	—	لیکس۔ پلسامیلا
	ناٹرک ایسڈ۔ نیرم کارب۔ نیرم فاس		
سیلنیم	—	اکنیشیا۔ پلسامیلا	چاتنا
سلفر	کلکیریا کارب۔ یلاڈونا	کیمفر۔ چاتنا۔ تھوجا	
فاسفورک ایسڈ	چاتنا	کیمفر۔ سلفر۔ سٹفی سائیکیرا	
فاسفورس	لائیکوپوڈیم۔ کللی کارب۔ سلفر	کیمفر۔ نکس و امیکا	کاسٹیکم لیمس
فلورک ایسڈ	چاتنا	کیمفر۔ سلفر۔ سٹفی سائیکیرا	
کاسٹیکم	کریفائنس۔ سلفر۔ سٹفی سائیکیرا	نکس و امیکا	
	لیکس		

ادویت	مدکار دوائیں	دفع اثر دوائیں	مخالف دوائیں
کریازوٹ	فاسفورس۔ سلفر	نکس و لمیکا	سلفر
کلکیریا کلاب	سلاڈونا۔ لائیکو پوڈیم۔ برشا کلاب	کیمر۔ نائٹرک ایسڈ۔ نکس و لمیکا	
کونیم	فاسفورس	چاتلا۔ سیپا	
کیپسکیم	نیزم میور	نائٹرک ایسڈ	زنک میٹ
کیلینڈیم	نائٹرک ایسڈ	کیمر۔ کیلینڈیم	
کینٹھرس	لہرس	کیپسکیم۔ اگنیشیا۔ بائیو سائیمس	
کریفائٹس	ارجنٹم نائٹ۔ کاسٹیکم۔ لائیکو پوڈیم۔ سلفر	پلساٹیل	
لائیکو پوڈیم	سلفر۔ لیکیس۔ کل کلاب۔ آئیوڈیم۔ اگنیشیا۔ کلکیریا کلاب۔ فاسفورس	نکس و لمیکا۔ چاتلا	
لیکیس	لائیکو پوڈیم۔ نائٹرک ایسڈ۔ فاسفورس۔ زنک۔ آئیوڈیم۔ کلکیریا کلاب	کیمر۔ چاتلا۔ کاسٹیکم	سیپا
مرک سل	سلاڈونا۔ سیپا، سلفر۔ نائٹرک ایسڈ	مرک سل	امونیا کلاب
نائٹرک ایسڈ	کیلینڈیم۔ سیپا۔ لائیکو پوڈیم	کونیم۔ مرک سل۔ پرو لیم۔ سلفر	لیکیس
نکس و لمیکا	سیپا۔ کونیم۔ کل کلاب۔ فاسفورس۔ پلساٹیل۔ سلفر	کیمر۔ اگنیشیا۔ تموجا۔ سلاڈونا	لیکیس۔ زنک میٹ۔ کاسٹیکم اگنیشیا
نیزم میور	لہرس۔ کیپسکیم۔ ارجنٹم نائٹ	کیمر۔ فاسفورس۔ نکس و لمیکا۔ کیمر۔ چاتلا	
ورنریم البم	آرنیکا		

